

DIRECTIVES POUR LE PATIENT SUR L'UTILISATION DE PICO-SALAX POUR LE LAVEMENT BARYTÉ

Un laxatif particulier et puissant doit être pris un jour avant de subir votre examen, et votre médecin vous a recommandé de prendre PICO-SALAX que vous pouvez acheter que vous pouvez acheter à la pharmacie de votre quartier. Vous devez être près d'une toilette après avoir pris le médicament, car il peut commencer à agir en l'espace de 1 à 3 heures.

La journée avant votre examen

Buvez seulement des liquides clairs : eau, jus de pommes, jus de canneberges, jus de raisin blanc, du soda au gingembre, du bouillon, du thé ou du café.

VEUILLEZ SUIVRE LES DIRECTIVES CIDESSOUS (ET NON CELLES CONTENUES DANS LA BOITE) :

Prenez le 1^{er} sachet de PICO-SALAX à midi (12 : 00)

Prenez le 2^{ieme} sachet de PICO-SALAX à 18 : 00

Prenez un verre d'eau (240 cc) avec 4 comprimés Dulcolax à 20 : 00

COMMENT PRENDRE LE PICO-SALAX :

- 1- Remplissez une tasse avec 150ml (3 onces) d'eau froide.
- 2- Videz le contenu du sachet dans la tasse (le mélange peut s'échauffer, laissez-le refroidir avant de le boire.)
- 3- Remuez pour 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le laxatif soit dissout.
- 4- Vous devez boire entre 1.5 litres et 2 litres d'eau ou d'autre liquide clair pendant les 4 heures qui suivent la prise de chaque sachet.

Le jour de l'examen

Insérez un suppositoire de Dulcolax (10mg) à 6 : 00 a.m.

Buvez seulement des liquides clairs : eau, jus de pommes, jus de canneberges, jus de raisin blanc, du soda au gingembre, du bouillon, du thé ou du café. Ne buvez pas des boissons qui ne sont pas transparentes.

Vous pouvez boire un peu d'eau pour vous désaltérer jusqu'à 4 heures avant votre examen.

Anticiper un séjour de deux heures de votre temps à passer au département de radiologie.